



Therapieschema parodontopathogene Markerkeime

(Erstellt in Zusammenarbeit mit Univ. Klinik für Zahn-, Mund und Kieferheilkunde, Graz 2017)

03/2021; Version 7.0

↕ Welcher Keim ist nachweisbar? ↕ je Spalte ablesen ↕

Ident	isoliertes Auftreten (nur 1 Keim nachweisbar)										mehrere Keime nachweisb.*		
Aa (dunkelroter Kplx)	x										x	x	x
Pg (roter Komplex)		x										x	x
Tf (roter Komplex)			x									x	x
Td (roter Komplex)				x								x	x
Pi (oranger Komplex)					x							x	x
Therapie-Schema	1	2	2	2	2							5	

Ident plus	isoliertes Auftreten (nur 1 Keim nachweisbar)										mehrere Keime nachweisb.*			
Pm (oranger Kplx)						x							x	
Fn (oranger Kplx)							x					x	x	
Cr (gelber Komplex)								x				x	x	
En (gelber Komplex)									x			x	x	
Ec (grüner Komplex)										x	x	x	x	
Cs (grüner Komplex)										x	x	x	x	
Therapie-Schema	1	2	2	2	2	3	2	4	4	1	1	1	5	6

*: in beliebiger Kombination möglich

Ident

Behandlungswürdig ab Keimzahl von:

Aa : <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>	(dunkelroter Kplx)	(+)
Pg : <i>Porphyromonas gingivalis</i>	(roter Komplex)	+
Tf : <i>Tannerella forsythia</i>	(roter Komplex)	+
Td : <i>Treponema denticola</i>	(roter Komplex)	+
Pi : <i>Prevotella intermedia</i>	(oranger Komplex)	+

Ident plus

Behandlungswürdig ab Keimzahl von:

Pm : <i>Parvimonas micra</i> (früher: <i>Peptostrep. micros</i>)	(oranger Komplex)	++
Fn : <i>Fusobacterium nucleatum/periodonticum</i>	(oranger Komplex)	+++
Cr : <i>Campylobacter rectus</i>	(gelber Komplex)	++
En : <i>Eubacterium nodatum</i>	(gelber Komplex)	++
Ec : <i>Eikenella corrodens</i>	(grüner Komplex)	+++
Cs : <i>Capnocytophaga spec. (gingivalis, ochracea, sputigena)</i>	(grüner K.)	+++

Keimzahl Interpretation:

- (+) spärlich
- + wenig
- ++ mäßig
- +++ reichlich
- nicht nachweisb.

Therapie-Schema	
1	Amoxicillin 3 x 500 mg/Tag; 7 Tage
2	Metronidazol 3x 500 mg/d; 7 Tage oder Amoxicillin 3 x 500 mg/d; 7 Tage oder Clindamycin 4x 300 mg/d; 7 Tage
3	Clindamycin 4x 300 mg/Tag; 7 Tage
4	Clarithromycin 2x250 mg/Tag; 7 Tage
5	Amoxicillin+Clavulansäure 3x625 mg/Tag & Metronidazol 3x 500 mg/Tag; 7 Tage
6	Amoxicillin+Clavulansäure 3x625 mg/Tag & Clindamycin 4x 300 mg/Tag; 7 Tage

Monotherapie:	Bei Überempfindlichkeit gegen Amoxicillin: Ciprofloxacin 2x250 mg/Tag 10 Tage oder Doxycyclin 1x200 mg/Tag (1.Tag), anschl. 1x100 mg/Tag (2-19. Tag)	Bei Überempfindlichkeit gegen Metronidazol: Clindamycin 4x300 mg/Tag 7 Tage oder Doxycyclin 1x200 mg/Tag (1.Tag), anschl. 1x100 mg/Tag (2-19. Tag)
	Kombitherapie: laut DGZMK und DGP	Ciprofloxacin 2x250 mg/Tag UND Metronidazol 2x500 mg/Tag 7 Tage

Die Auswahl des geeigneten Präparates zur Therapie obliegt dem behandelnden Arzt!