

Anzeige gemäß § 2 Abs. 1 des Epidemiegesetzes 1950

Anlage I

Patient:in (Name, Vorname(n), Titel) Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers Geburtsdatum: _____ Sozialversicherungsnummer: _____ Adresse: _____ Telefonnummer: _____ E-Mail-Adresse: _____	☐ Verdacht auf Erkrankung ⁴ ☐ Erkrankung (in der Regel liegt eine Laborbestätigung vor) Erkrankungsdatum: _____ Diagnosedatum: _____ ☐ Tod _____ Todesdatum: _____ ☐ Ausscheider:in	
☐ Amöbenruhr ¹ ☐ Anthrax/Milzbrand ¹ ☐ Aviäre Influenza/Vogelgrippe ¹ ☐ Botulismus ^{1,3} ☐ Brucellose ² ☐ Campylobakteriose ^{1,3} ☐ Chikungunya-Fieber ² ☐ Cholera ¹ ☐ <i>Clostridioides difficile</i> -Infektion, schwere Verlaufsform ² ☐ Dengue-Fieber ² ☐ Dengue-Fieber, schwere Verlaufsform ☐ Diphtherie ² ☐ Respiratorische Diphtherie ☐ Hautdiphtherie ☐ Echinokokkose durch Fuchsbandwurm ¹ ☐ Echinokokkose durch Hundebandwurm ¹ ☐ Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ² ☐ Gelbfieber ¹ ☐ invasive <i>Haemophilus influenzae</i> -Erkrankung ² ☐ Epiglottitis ☐ Meningitis ☐ Meningitis UND Sepsis ☐ Osteomyelitis/septische Arthritis ☐ Pneumonie ☐ Sepsis ☐ Hämorrhagisches Fieber, viral ¹ ; Erreger: _____ ☐ Hantavirus-Erkrankung ² ☐ Hantavirus-Infektion ¹ , Mensch-zu-Mensch übertragbar ☐ Hepatitis A ¹ ☐ Hepatitis B ¹ ☐ Hepatitis C ¹ ☐ Hepatitis D ¹ ☐ Hepatitis E ¹ ☐ Lebensmittelbedingte Intoxikation ☐ <i>S.aureus</i> ☐ <i>B. cereus</i> ☐ <i>C. perfringens</i> ¹ ☐ Legionärskrankheit/Legionellose ² ☐ Lepra ¹ ☐ Leptospirose ¹ ☐ Listeriose ^{1,3} ☐ Malaria ² ☐ Masern ¹ Exanthem-Beginn: _____ ☐ invasive Meningokokken-Erkrankung ² ☐ Meningitis ☐ Meningitis UND Sepsis ☐ Pneumonie ☐ Sepsis OHNE Meningitis ☐ Andere	☐ Middle East Respiratory Syndrome (MERS) ¹ ☐ Mpox ¹ Exanthem-Beginn: _____ ☐ Norovirus-Gastroenteritis ^{1,3} ☐ Paratyphus ¹ ☐ Pertussis/ Keuchhusten ² ☐ Pest ¹ ☐ Pocken ¹ ☐ Poliomyelitis/ Kinderlähmung ¹ ☐ invasive Pneumokokken-Erkrankung ² ☐ Bakteriämische Pneumonie ☐ Meningitis ☐ Meningitis UND Sepsis ☐ Sepsis ☐ Andere ☐ Psittakose ¹ ☐ Puerperalfieber/Wochenbettfieber ¹ ☐ Rickettsiose durch <i>R. prowazekii</i> /Fleckfieber ¹ ☐ Röteln ² ☐ Rötelnembryopathie ☐ Rotavirus-Gastroenteritis ^{1,3} ☐ Rotz/ Malleus ¹ ☐ Rückfallfieber ² ☐ Salmonellose ^{1,3} ☐ schweres akutes respiratorisches Syndrom (SARS) ¹ ☐ Scharlach ² ☐ Antigennachweis ☐ Shigellose ^{1,3} ☐ STEC-Infektion (Infektion durch Shigatoxin-bildende <i>E.coli</i>) ^{1,3} ☐ HUS ☐ Tollwut/ Wutkrankheit ¹ ☐ Tollwutexposition, mögliche; durch Bissverletzung ¹ ☐ Trachom ² ☐ Transmissible spongiforme Enzephalopathie, human ¹ ☐ Trichinose/ Trichinellose ² ☐ Tularämie ¹ ☐ Typhus abdominalis ¹ ☐ Varizellen-Meningoenzephalitis ² ☐ West-Nil-Virus-Erkrankung ² ☐ Yersiniose ^{1,3} ☐ Zika-Virus-Erkrankung ² ☐ angeborene Zika-Virus-Erkrankung ² ☐ Sonstige bakterielle lebensmittelbedingte Erkrankung ¹ ☐ Sonstige <i>E. coli</i> -Enteritis (ETEC, EIEC, EPEC, EaggEC), lebensmittelbedingt ¹ ☐ Sonstige invasive bakterielle Erkrankung (Meningitis, Sepsis) ² ☐ Sonstige virale lebensmittelbedingte Erkrankung ¹ ☐ Sonstige virusbedingte Meningoenzephalitis ² Angabe des Erregers, wenn unter „Sonstige“: _____	
☐ geimpft ☐ geimpft, aber Intervall überzogen Anzahl erhaltener Impfdosen: _____ Datum der letzten Impfung: _____ Impfstoff (Produktname): _____ ☐ nicht geimpft		
☐ Patient:in ist in medizinischer Einrichtung tätig ☐ Patient:in ist in Lebensmittel verarbeitender Einrichtung tätig ☐ Patient:in ist in einer Gemeinschaftseinrichtung tätig, z.B. Kindergarten, Schule, Pflegeheim, sonstige Massenunterkünfte ☐ Patient:in wird in einer Gemeinschaftseinrichtung/gesundheitsversorgender Einrichtung betreut ☐ Auslandsaufenthalt Reiseland: _____ Aufenthaltsperiode: von _____ bis _____		
Meldende Person (Ärzt:in, Praxis, Krankenanstalt, Adresse, E-Mail, TelefonNr.): _____	Meldedatum: _____	An die Bezirksverwaltungsbehörde-Gesundheitsamt: _____

¹ Verdacht, Erkrankung und Tod meldepflichtig; ² Erkrankung und Tod meldepflichtig; ³ lebensmittelbedingt⁴ Verdacht auf das Vorliegen einer bestimmten Krankheit aufgrund Krankheitszeichen (Symptome) und Anamnese. Beispiele für Symptome gemäß klinischen Kriterien der Falldefinition, siehe Blattrückseite.

Klinische Kriterien laut Falldefinitionen

Amöbenruhr

Intestinale Amöbose: Mindestens eines der folgenden Symptome: (blutig-schleimiger) Durchfall; Entzündung des Dickdarms
Extraintestinale Amöbose (Amöbenleberabszess): Mindestens eines der folgenden Symptome: Schmerzen im rechten Oberbauch; extraintestinale Abszesse

Anthrax/Milzbrand

Hautmilzbrand, Gastrointestinalmilzbrand, Lungenmilzbrand, Meningitis/Meningoenzephalitis-Milzbrand, septikämischer Milzbrand

Aviäre Influenza/Vogelgrippe

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber, Frösteln, Kopfschmerzen, Muskel-, Glieder-, Rückenschmerzen, Lungenentzündung, Durchfall oder Erbrechen, ARI, SARI, Konjunktivitis, Enzephalitis, Meningitis

Botulismus

Lebensmittel- und Wundbotulismus: Mindestens eines der beiden Symptome: beidseitige Schädigung der Hirnnerven (z. B. Diplopie, verschwommene Sicht, Dysphagie, bulbäre Schwäche); periphere symmetrische Lähmung
Botulismus bei Kleinkindern: Jedes Kleinkind mit mindestens einem der folgenden Symptome: Verstopfung; Lethargie; Stillprobleme; Ptosis; Dysphagie; allgemeine Muskelschwäche

Brucellose

Fieber und mindestens eines der folgenden Symptome: Schweißausbrüche (profus, übelriechend, vor allem nachts); Schüttelfrost; Arthralgie; Schwächegefühl; Depression; Kopfschmerzen; Anorexie

Campylobakteriose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Bauchschmerzen; Fieber

Chikungunya-Fieber

Akuter Fieberbeginn >38,5°C UND schwere Arthralgie, die nicht durch eine andere Krankheit erklärt werden kann

Cholera

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

Clostridioides difficile-Infektion (CDI), schwere Verlaufsform

Mindestens eines der drei folgenden Kriterien:
 Aufnahme/Verlegung auf eine Intensivstation aufgrund einer CDI oder ihrer Komplikationen; Durchführung eines chirurgischen Eingriffs (z.B. Kolektomie) aufgrund eines Megakolons, Darmperforation od. Therapie-refraktären Kolitis; Tod innerhalb von 10 Tagen nach Diagnosestellung einer CDI und Wertung der CDI als direkte Todesursache oder als zum Tode beitragende Erkrankung

Dengue-Fieber

Eine der folgenden klinischen Manifestationen: Fieber (*Denguefieber*); schwere Verlaufsform: Fieber und hämorrhagische Verlaufsform (*hämorrhagisches Denguefieber*); Fieber und hämorrhagische Verlaufsform und Herz-/Kreislaufversagen (*Dengue-Schock-Syndrom*)

Diphtherie

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen:
Klassische respiratorische Diphtherie: Erkrankung der oberen Atemwege mit Laryngitis/Nasopharyngitis/Tonsillitis und eine adhärenzte Membran/Pseudomembran
Milde respiratorische Diphtherie: Erkrankung der oberen Atemwege mit Laryngitis/Nasopharyngitis/Tonsillitis ohne adhärenzte Membran/Pseudomembran
Hautdiphtherie: Hautläsion
Sonstige Diphtherie: Läsion der Augenbindehaut oder der Schleimhäute

Echinokokkose/Hundebandwurm/Fuchsbandwurm

Klinische Kriterien für Überwachungszwecke irrelevant

Frühsummer-Meningoenzephalitis (FSME)

Symptome eines entzündeten ZNS, z.B. Meningitis; Meningoenzephalitis; Enzephalomyelitis; Enzephaloradikulitis

Gelbfieber

Fieber UND mindestens einer der beiden folgenden Symptome: Gelbsucht, generalisierte Blutungen

Hämorrhagisches Fieber, viral (Ebola-, Krim-Kongo-, Marburg-, Lassa-Fieber und andere):

Fieber ≥ 38,6°C UND zumindest eines der folgenden Symptome: starke Kopfschmerzen; Pharyngitis; Erbrechen; Durchfall; Bauchschmerzen; Blutungen; Multi-Organversagen ODER plötzlicher und unerklärlicher Tod

Hantavirus-Erkrankung

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen:
 (1) Fieber;
 (2) hämorrhagische Verlaufsform (*Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom*);
 (3) Nierenfunktionsstörung;
 (4) mindestens zwei der folgenden Symptome: Durchfall; Dyspnoe; Herz-/Kreislaufversagen; (Hantavirus-induziertes kardio-pulmonales Syndrom (HCPS)); Husten; Lungeninfiltrate (*Hantavirus-induziertes pulmonales Syndrom* (HPS)); Kopfschmerzen; Muskel-, Glieder- oder Rückenschmerzen; neu aufgetretene Myopie („Verschwommensehen“); Übelkeit oder Erbrechen

Hepatitis, akut – gilt für HAV-, HBV-, HCV-, HDV-, HEV-Infektion

Müdigkeit; Bauchschmerzen; Appetitverlust; zeitweilige Übelkeit und Erbrechen und mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Gelbsucht; erhöhte Serum-Aminotransferase-Aktivität

Hepatitis, chronisch – gilt für HBV-, HCV-, HDV-Infektion

Klinische Kriterien für Überwachungszwecke irrelevant

Legionärskrankheit /Legionellose

Radiologische/ klinische Pneumonie

Lepra

Mindestens eine der vier folgenden klinischen Manifestationen:

Indeterminierte Lepra: Einzelne, hypopigmentierte, makulöse (fleckige) Hautläsionen
Tuberkuloide Lepra: Vorliegen der beiden folgenden Symptome: einzelne, abgegrenzte, hypopigmentierte, am Rande papulös erhabene, sensibilitätsgestörte Hautareale; verdickte periphere Hautnerven
Leptomatöse Lepra: Vorliegen einer der beiden folgenden Symptome: zahlreiche beidseitig, symmetrisch angeordnete makulopapulöse (fleckig-erhabene) Läsionen der Haut oder Schleimhaut der oberen Atemwege; knotig-flächenhafte Hautinfiltrationen
Borderline Lepra: Mindestens je eines der Symptome der tuberkuloïden und leptomatösen Form

Leptospirose

Fieber ODER mindestens zwei der folgenden Symptome: Schüttelfrost; Kopfschmerzen; Myalgie; Bindehautsuffusion; Haut- und Schleimhauteinblutungen; Exanthem; Gelbsucht; Myokarditis; Meningitis; Nierenfunktionsstörung; Hämoptysen

Listeriose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Meningitis oder Meningoenzephalitis oder Enzephalitis; gripeähnliche Symptome; Septikämie; lokalisierte Infektionen wie Arthritis, Endokarditis, Endophthalmitis, Abszesse
Listeriose in der Schwangerschaft: Spontanabort; Fehlgeburt; Totgeburt (fötaler Tod nach 20. SSW); Frühgeburt (vor 37. SSW)
Neugeborenen-Listeriose: mindestens eines der folgenden Symptome im ersten Lebensmonat: Meningitis oder Meningoenzephalitis; Sepsis; Dyspnoe; Granulomatosis infantiseptica; Haut-, Schleimhaut- oder Bindehautläsionen

Malaria

Fieber oder Fieber in der Anamnese.

Masern

Fieber UND makulopapulöses Exanthem und mindestens eines der folgenden Symptome: Husten, Schnupfen, Konjunktivitis

Invasive Meningokokken-Erkrankung

Meningeale Symptome, hämorrhagisches Exanthem, septischer Schock, septische Arthritis

MERS

Akutes respiratorisches Syndrom (mit oder ohne Fieber, mit oder ohne Husten), bei dem basierend auf klinischen, radiologischen od. histopathologischen Hinweisen auf ein entzündliches Infiltrat der Verdacht besteht, dass die unteren Atemwege betroffen sind (z.B. Pneumonie oder akutes Atemnotsyndrom)

Mpx

Mindestens zwei der folgenden klinischen Manifestationen:
 (1) Fieber (>38,5°C), Myalgie, Arthralgien, Cephalgie, Rückenschmerzen, schmerzhafte Lymphadenopathie, Fatigue (Prodromalstadium)
 (2) Makulopapulöses oder vesikulopustulöses Exanthem (lokal oder generalisiert), möglicherweise mit Nabelung oder Schorfbildung
 (3) Schmerzhafte Schleimhautläsionen

Norovirus-Gastroenteritis

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

Pertussis/Keuchhusten

Mindestens zwei Wochen anhaltender Husten UND mindestens eines der folgenden Symptome: Hustenanfälle; Keuchen beim Einatmen; posttussives Erbrechen ODER ärztliche Keuchhusten-Diagnose ODER Apnoe-Episoden bei Kleinkindern

Pest

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen:
Beulenpest: Fieber UND plötzliches Auftreten schmerzhafter Lymphadenitis;
Pestsepsis: Fieber

Lungenpest: Fieber UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten; Brustschmerzen; Hämoptysen

Pocken

Fieber UND Bläschen oder feste Pusteln im gleichen Entwicklungsstadium mit zentrifugaler Verteilung ODER Fieber und atypisches Erscheinungsbild (mindestens eines der folgenden Symptome: hämorrhagische Läsionen; flache samtige Läsionen, die nicht zu Bläschen fortschreiten; Variola sine eruptione; milderer Typ)

Poliomyelitis/Kinderlähmung

Akute schlaffe Parese < 15a oder sonstiger Polioverdacht

Psittakose

Mindestens eines der folgenden Kriterien: Pneumonie; Endo- oder Myokarditis oder mindestens zwei der fünf folgenden Symptome: Fieber, Hepatosplenomegalie, Hepatitiszeichen, Husten, Kopfschmerzen

Puerperalfieber/Wochenbettfieber

Fieber; Unterbauchschmerzen; Druckempfindlichkeit oder schlechte Kontraktion des Uterus; verstärkter, verminderter, blutiger oder übelriechender Lochialfluss

Rickettsiose/Fleckfieber

Fieber

Röteln

Plötzliches Auftreten eines generalisierten makulopapulösen

Exanthems UND mindestens einer der folgenden Symptome: zervikale, subokzipitale oder postaurikuläre Adenopathie; Arthralgie; Arthritis

Rötelnembryopathie (CRS)

Jedes Kleinkind unter 1a oder jedes Totgeborene mit mindestens zwei der unter Kategorie A angeführten Befunde ODER einem Befund der Kategorie A und einem der Kategorie B:
Kategorie A: Katarakt(e); angeborenes Glaukom; angeborene Herzkrankheit; Gehörverlust; Retinopathia pigmentosa
Kategorie B: Purpura; Splenomegalie; Mikrozephalie; Entwicklungsverzögerung; Meningoenzephalitis; Atrophie der Knochen mit vermehrter Strahlendurchlässigkeit; Gelbsucht innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt

Rotavirus-Gastroenteritis

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

Rotz/Malleus

Mindestens eines der folgenden Symptome: Appetitlosigkeit; Fieber mit Schüttelfrost; Myalgien/Arthralgien in Kopf und Brust; Nasensekretion; Lichtempfindlichkeit

Rückfallfieber

Fieber

Salmonellose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Fieber; Bauchschmerzen; Erbrechen

SARS

Akutes Fieber oder Fieber in der Anamnese UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten; Atembeschwerden; Kurzatmigkeit UND mindestens einem der folgenden Befunde: radiologischer Pneumonie-Nachweis; radiologischer Nachweis des akuten respiratorischen Distress-Syndroms; Autopsiebefund Pneumonie; Autopsiebefund des akuten respiratorischen Distress-Syndroms UND Fehlen einer alternativen Diagnose

Scharlach

Mindestens eines der folgenden Symptome: Pharyngitis; Impetigo/Pyodermie; Wundinfektion; septisches Krankheitsbild UND feinfleckiges Exanthem (makulopapulös) UND mindestens eines der folgenden Symptome: fleckiges Exanthem am weichen Gaumen; Himbeer- oder Erdbeerzunge; Abschuppen der Haut bei Abheilung des Exanthems unter Betonung der palmoplantaren Bereiche

Shigellose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Fieber; Erbrechen; Bauchschmerzen

STEC-Infektion

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Bauchschmerzen. **HUS:** akutes Nierenversagen und mikroangiopathische hämolytische Anämie und/oder Thrombozytopenie

Tollwut/Wutkrankheit

Akute Enzephalomyelitis UND mindestens zwei der folgenden Symptome: sensorische Veränderungen im Zusammenhang mit einem Tiebiss an der Bissstelle; Parese oder Paralyse; Krämpfe der Schluckmuskeln; Hydrophobie; Delirium; Krämpfe; Angstzustände

Trachom/ägyptische Körnerkrankheit

Klinische Zeichen einer follikulären Konjunktivitis (Akutphase), Entropion, Hornhautulzera/-vernarbung, Trichiasis (Spätstadium)

Trichinose/Trichinellose

Mindestens drei der folgenden Symptome: Fieber; Muskelschmerzen; Durchfall; Gesichtssödem; Eosinophilie, subkonjunktivale, subunguale und retinale Blutungen

Tularämie

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen:
Ulceroglanduläre Tularämie: kutaner Ulkus und regionale Lymphadenopathie
Glanduläre Tularämie: vergrößerte und schmerzhafte Lymphknoten ohne erkennbaren Ulkus
Okuloglanduläre Tularämie: Konjunktivitis und regionale Lymphadenopathie
Oropharyngeale Tularämie: zervikale Lymphadenopathie und mind. einer der folgenden Befunde: Stomatitis; Pharyngitis; Tonsillitis
Intestinale Tularämie: mindestens eines der folgenden Symptome: Bauchschmerzen; Erbrechen; Durchfall
Pulmonäre Tularämie: Pneumonie
Typhoidale Tularämie: mind. eines der folgenden Symptome: Fieber ohne frühe Lokalisierungsanzeichen und -symptome; Sepsis

Typhus/Paratyphus

Anhaltendes Fieber oder mindestens zwei der folgenden Symptome: Kopfschmerzen; relative Bradykardie; Husten ohne Auswurf; Durchfall; Verstopfung; Unwohlsein oder Bauchschmerzen

West-Nil-Virus-Erkrankung

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber, Enzephalitis, Meningitis

Yersiniose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Durchfall; Erbrechen; Bauchschmerzen (Pseudoappendizitis); Stuhlzwang

Zika-Virus-Erkrankung

Hautausschlag UND eines der folgenden Symptome: Fieber, makulopapulöser Hautausschlag, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Konjunktivitis, Guillain-Barré-Syndrom

Angeborene Zika-Virus-Erkrankung

Mikrozephalie, intrazerebrale Verkalkungen, sonstige Störungen des ZNS bei Föten oder Neugeborenen

